

- ORBÁN S.-VAJDA L. (1983): Magyarország mohafőjének kézikönyve, Akadémiai Kiadó, Bp. 518 pp.
- PAPP L.-DUDÁS M. (1988): Adatok a Közép- és Dél-Nyírség és környékének botanikai értékeiről I. - Calandrella, 4 (1): 5-24.
- Soó R. (1937): Pótlékok nyírségi flórákutatásunk eredményeihez I. - Bot. Közlem. 34: 33-44.
- Soó R. (1942): Pótlékok nyírségi és tiszántúli flórákutatásunk eredményeihez III. - Bot. Közlem. 39: 45-56.
- STANDOVÁR T.-TÓTH Z. - SIMON T. (1991): Vegetation of the Bátorliget mire reserve. In: MAHUNKA S. (ed.): The Bátorliget Nature Reserves after forty years., Hungarian Natural History Museum, Bp., pp. 57-118.
- VAS M. (1983): Természetvédelmi intézkedések hatása a kállósejéni Nagymohoson. - Bot. Közlem. 70 (1-2): 25-35.
- WARNSTORF C. (1895): Beiträge zur Kenntnis der Bryophyten Ungarns. - Österreichische Botanische Zeitschrift 45: 94-97., 137-143.
- MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZINÉV-TÁRA II. (1981): Szabolcs-Szatmár megye, Kartográfiai Vállalat, Bp.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni Dr. ORBÁN SÁNDORNAK, aki a problémásabb taxonok revideálását elvégezte, illetve néhány faj határozásában közreműködött, valamint a témában való elmélyülésemhez is sokban hozzájárult.

Summary - Bryophyte flora of the Nyírség (NE Hungary) I. (floristical part)

The author presents the history of the bryological research in the Nyírség area, then shows the data of the literature and his collection. Some interesting species: *Cephalozia subdentata*, *C. rubella*, *C. divaricata*, *Sphagnum fimbriatum*, *Sphagnum squarrosum*, *Dicranum montanum*, *D. bonjeanii*, *D. viride*, *Leucobryum glaucum*, *Enthostodon hungaricus*, *Tetraxis pellucida*, *Bryum rubens*, *Isoetecium myurum*, *Rhynchostegium riparioides*, *Plagiothecium undulatum*, *P. curvifolium*, *P. ruthei*, *P. cavifolium*, *P. laetum*, *Ptilium crista-castrensis*. The next part of the publication will show the description of character of the investigation area.

Kitaibelia	II. évf. 2. szám	pp.: y.	Debrecen 1997
------------	------------------	---------	---------------

Egy újabb glaciális reliktum a keleméri Kismohosról

JAKAB Gusztáv

KLTE Növénytan Tanszék, Debrecen 4010 Pf.: 14.

1994 szeptemberében néhány kapszulányi mohát gyűjtöttem a keleméri Mohos-tavakon. A gyűjtött anyag egy részét csak 1997-ben határoztam meg. Egy tözegmoha közül gyűjtött példány a *Calliergon stramineum* (Brid.) Kindb. lombosmohának bizonyult. Ez a boreális elterjedési karakterrel rendelkező fajt hazánkban először VAJDA (1953) a Kemence-patak mellől (Zempléni-hg.) jelezte. Érdekes módon ezt az adatot később ORBÁN-VAJDA (1983) már nem említi. Utóbb a Nyugat-Dunántúlról, az Őrségből (Ispánk) került elő (BOROS 1968).

A legutóbbi botanikai vizsgálat, amely a keleméri Mohosok mohafőjét is bemutatja (CZENTHE 1995) sem említi ezen fajt a területről. A *Calliergon stramineum* sokszor csak igen kis mennyiségben nő egy lelőhelyen, emiatt feltételezhető a faj jövőbeli előkerülése hazánk további tözegmohás lápjairól is.

Irodalom

- BOROS Á. (1968) Bryogeographie und Bryoflora Ungarns. - Akadémiai Kiadó, Budapest, pp.: 466.
- CZENTHE B. (1985) A keleméri Mohos-tavak cönológiai viszonyai. - Botanikai Közlemények 72: 89-101.
- ORBÁN S.-VAJDA L. (1983): Magyarország mohafőjének kézikönyve, Akadémiai Kiadó, Bp. 518 pp.
- VAJDA L. (1953): Neuere Beiträge und bryogeographische Beobachtungen zur Moosflora Ungarns. - Annal. Mus. Nat. Hung. 4: 23-33.

Summary

The author found the *Calliergon stramineum* (Brid.) Kindb. on the "Kismohos-bog" near Kelemér. This is the third data of this species from Hungary.