

Throphoblastos megbetegedések klinikánkon – IUI-t követő partialis molaterhesség

Farkas Ágnes, Sáy Tamás, Póka Róbert

Debreceni Egyetem KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

A throphoblastos megbetegedések négy fő csoportját különíthetjük el: mola hydatidosa, invazív mola, choriocarcinoma és peteágyi throphoblasttumor. Klinikánkon az elmúlt tíz évben közel negyven beteget láttunk el throphoblastos megbetegedés miatt. Döntő többségében a betegeket partialis vagy komplett molaterhesség miatt kezeltük. Choriocarcinomával ritkán, mindösszesen hét esetben találkoztunk.

Esetünkben egy 32 éves nőbeteget mutatunk be. A beteg anamnézisében egy spontán vetélést követően több, mint egy éves steril periódus következett, emiatt indult kivizsgálás a Meddőségi Szakrendelőnkben. Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján (PCT) és a meddőség időtartama

miatt intrauterin inszemináció alkalmazása mellett döntöttünk. Sikeres stimulációt és inszeminációt követően (ultrahang és laborvizsgálattal igazolt) partialis molaterhesség alakult ki, mely a műtétes beavatkozások ellenére perzisztált, így a beteg kemoterápiában részesült (methotrexat+folsav) több ciklusban. A kezelések hatására a beteg laborértékei (béta HCG) rendeződtek, az ultrahang negatív lett. A betegnek rendszeres kontroll mellett egy éves várakozást javasoltunk a következő terhesség vállalásáig.

Ezen idő alatt, figyelembe véve a beteg kérését is, a 2 sikertelen terhességet és a több alkalommal végzett műtétes beavatkozásokat további vizsgálatokat tervezünk, többek között a méh üregének revisióját is.