


Ofloxacin-B

200 mg,
Trio 200 mg
filmtabletta

ofloxacin

www.teva.hu



• Egyenértékű terápia kedvezőbb áron

2005. július 1-től érvényes térítési díjak (Ft)

	Trio 200 mg, 3x	200 mg, 10x	400 mg, 10x
Ofloxacin-B filmtabletta	306	786	1456
Zanocin filmtabletta	Nincs ilyen kiszerelés	1052	Nincs ilyen kiszerelés
Tarivid filmtabletta	Nincs ilyen kiszerelés	1547	Nincs ilyen kiszerelés

Az Ofloxacin-B 200 mg filmtablettát az OGYI a Tarivid 200 mg filmtablettával és a Zanocin 200 mg filmtablettával egyenértékűnek, a terápia során egymással helyettesíthetőnek minősítette. (A 12/2001 (IV. 12.) EüM rendelet 14.§ (3)-(4) bekezdése alapján)

legkedvezőbb térítési díj ►

Rövidített alkalmazási előirat

ATC: J01MA01
Javallatok: Ofloxacin-érzékeny patogének okozta fertőzések. Ofloxacin-B-Trio 200 mg filmtabletta: szövödménymentes also húgyúti fertőzések. Ofloxacin-B 200mg, 400mg filmtabletta: Akut, krónikus és recidiváló legúti fertőzések, ha azokat *Haemophilus influenzae* vagy egyéb Gram-negatív illetve multi-rezisztens kórokozók, valamint *Staphylococcus aureus* okozta. Pneumóniák, különösen, ha nehezen reagáló baktériumok okozzák, mint pl. *E. coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Proteus*, *Pseudomonas*, *Legionella* vagy *Staphylococcus*. Krónikus és recidiváló ful-orr-gégészeti infekciók, főleg akkor, ha Gram-negatív kórokozók (beleértve a *Pseudomonas*) és *Staphylococcus* váltották ki. Bor- és lágyrészfertőzések; Csont és izületi fertőzések;

Hasüregi és kismemencei fertőzések; Bakteriális enteritis; Vese- és húgyúti fertőzések; Genitális fertőzések; Gonorrhoea; Szignifikánsan csökkent rezisztenciájú betegek ofloxacinra érzékeny kórokozók által kiváltott fertőzéseinek megelőzése. Ellenjavallatok: Ofloxacinra, más kinolon típusú gyógyszerekre, vagy a készítmény bármely összetevőjére való túlérzékenység. Anamnézisében tendinitis vagy epilepsia, a központi idegrendszer előzetes károsodása után kialakult csökkent górcsúszó. Gyermekek, növekedésben lévő serdülők, terhesség és szoptatás. Adagolás: Felnőttkor: 200-800 mg/nap, a fertőzés súlyosságától függően. Egyszeri alkalommal legfeljebb 400 mg. Napi egyszeri (reggeli) 400 mg hatásában egyenértékű napi 2 x 200 mg-mal. Beszűkült veseműködés és súlyos májkarosodás esetén az adagolás módosítása szükséges. Mellékhatások: Gastrointesztinális tünetek (étvágytalanság,

emelygés, hasmenés, pseudomembranosus colitis). Májkarosodás. Központi idegrendszeri tünetek (ritkán álmoság, tremor, fejfájás, látás, érzékelési, hallás, egyensúlyzavarok, zsihadás). Cardiovasculáris tünetek (tachycardia, átmeneti vérnyomásesés). Igen ritkán vérképzőszervi elterjedés. Allergiás tünetek, igen ritkán anafilaxiás reakció. Fényérzékenység. Veseműködési zavar. Vércukorszint emelkedés vagy csökkentés. Izületi, izomfájdalmak, ritkán inpanaszok (gyulladás, ruptura). Az erős napsütést. UV sugár: zást a kezelés ideje alatt kerülni kell! Gyógyszerkölcsönhatások: Anticidok, szulfátok, vaskészítmények: az ofloxacin ezen készítmények alkalmazása előtt kb. 2 órával kell bevenni. Anticoagulánsok, teofilin vagy más górcsúszó-csökkentők, NSAID-ok, glibenclamid, vesein keresztül, tubuláris szekrecióval ürülő szerek: ofloxacinnal történő egyuttadás esetén a betegek fokozott ellenőrzése szükséges. Kérjük, olvassa el a részletes alkalmazási előíratot. OGYI-F8547/01, OGYI-F8548/01, OGYI-F8549/01


Ofloxacin-B
Három kívánság teljesítve.

TEVA
Magyarország

Köszöntő

Magyar Urológia, XVII. évfolyam, 2. szám (2005)

Dr. Tóth Csaba professzor 65 éves



Tóth Csaba 1940. szeptember 1-én született Kiskunfélegyházán. A középiskola befejezése után a Szegedi Orvostudományi Egyetem hallgatója, 1964-ben szerzett orvosi diplomát. Egész életpályáját meghatározta az a döntése, hogy Szentesen, Bugyi István sebész professzor mellett kezdi munkáját. A máig tisztelt és szeretett Tanítómestertől sajátította el a sebészet mesterfogásait, amelyeket ma is sikerrel, eredményesen alkalmaz, és nagy örömmel adja tovább munkatársainak. Ugyancsak a tisztelt Professzorának köszönheti az olvasás, írás szeretetét, mellette ismerte meg a szakmai közlemények írásának fortélyait.

1968-ban sebészetből, 1972-ben urológiából szakvizsgázott, majd 1976-ban végleg elkötelezte magát az urológiával, ekkor lett a Szentesi Kórház urológiai részlegének, majd osztályának vezető főorvosa. A Bugyi István mellett megszerzett szakmai ismeretekre alapozva, a kis vidéki kórház urológiai osztályáról elindulva alkot igen kiemelkedőt a magyar urológiában. Mind a nyílt, mind az endoszkópos műtéti technikában a tökéletességre törekedett, több ezer betegnek visszaadva így az egészségét. Nagy sebészeti gyakorlata tükrében már ekkor értetlenül állt a szakma peritoneumon belüli műtétektől való félelmével szemben. Munkásságának magas színvonalát, tudományos ambícióját bizonyította 1980-ban, amikor sikerrel védte meg kandidátusi értekezését. Ebben az évben vált önállóvá az általa alapított urológiai osztály.

Az új iránti fogékonyságát jelzi, hogy az 1984-ben, a németországi tanulmányútján megismert endoszkópos vesekő-eltávolítást nagyon gyorsan, hazánkban elsőként vezette be, száműzve ezzel a vesekő miatti nyílt műtéteket, a köves nephrectomiákat. A nyolcvanas évek második felében az ország urológusainak többsége megfordult a Szentesi Kórház Urológiai osztályán, ahová tanulni mentek.

1988 újabb mérföldkő Tóth Csaba életében, Kecskemétre hívták, a Megyei Kórház Urológiai Osztályának élére. Itt a nyílt, valamint az endoszkópos műtéti tevékenysége kiteljesedett és újabb műtéti technika, a laparoszkópia kellette fel érdeklődését. Töretlen a tudományos tevékenysége is, amelyet közlemények sora, könyvek megjelenése jeleznek, majd 1990-ben az orvostudomány doktora lett. 1994-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen habilitált. Időközben, 1994–1997 között a Magyar Urológusok Társaságának elnöke, így rendezte a Társaság 10. jubileumi kongresszusát.

A szakmai pályafutás kiteljesedésének csúcsa Debrecen, ahol az egykori Bugyi István tanítványból mester lett, iskolateremtő mester. 1995-ben a rektori vezetés meghívására vette át a Debreceni Orvostudományi Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatását, amellyel annak addig is elismert munkásságát sikerült jelentősen emelnie.

Magas színvonalon kiteljesedett a klinika endoszkópos műtéti tevékenysége. A perkután és ureteroszkópos köeltávolítás mellett a perkután ureterolithotomia nemzetközi visszhangra talált. Kiemelkedő eredmények születtek az endopyelotomia segítségével és az országban egyedüli intézetként, a csecsemők-kisgyermek endoszkópos köeltávolítását végzik irányításával, de *Tóth professzor* nevéhez kötődik az ESWL-készülék beszerzése is. Széles körben került alkalmazásra a lézerterápia a húgyhólyag, a prosztatata- és a húgycső betegségeiben. A vesedaganatok nyílt műtéti során mindennaposá váltak a szervmegtartó műtétek, a Szívsebészettel az együttműködés pedig lehetővé tette a kiterjedt cava tumor-trombusos betegek megmentését. Országosan kiemelkedő az a műtéti tevékenység, amelyet a radikális perineális prostatectomiával ért el *Tóth professzor*, ma már valamennyi vezető munkatársa végzi ezt a műtétet. Az urodinámiára alapozva, irányításával jelentősen emelkedett a korszerű antiinkontinens műtétek száma, de nevéhez fűződik a konzervatív kezelések bevezetése is, az intravaginális és az elektromagnetikus ingerterápia segítségével.

Mérföldkő az intézet, de a magyar urológia életében is a vezetésével Debrecenben is meghonosított és kiteljesedett laparoszkópos műtéti ellátás. A tumorok miatti radikális nephrectomiák és szervmegtartó-műtétek mellett, hazánkban elsőként, útmutatásával került bevezetésre a radikális laparoszkópos prostatectomia, igen szép eredményekkel. A további laparoszkópos tevékenységet tanítványai viszik egyre nagyobb magaslatokra.

Amikor egy intézet igazgatója 65 éves lesz, munkásságát a kollégák eredményei is jelzik. Vezetése alatt a klinika négy munkatársa és egy főorvos tanítványa védte meg PhD disszertációját, hárman a beadás előtt állnak. Tanítványai közül három hazai, egy külföldi osztályvezető főorvos, kettő főorvos lett. A klinikán egy docens, nyolc adjunktus és egy szakorvosjelölt vezetője. Az intézetben jelentősen emelkedett az impakt faktoros közleményeinek száma, könyvek, tudományos CD-k jelentek meg, *Tóth professzor* egyetemi tankönyvet szerkesztett.

Kimagasló oktató munkája is, egyetemi oktató tevékenységét az „Év Oktatója” és az „Egyetem Kiváló Oktatója” kitüntetések jelzik. Színes, lenyűgöző előadásain megtelnek a padosok, szuggesztív egyénisége, kifejezetten gyakorlatias szemléletű előadásai, kredit kurzusai vonzzák a hallgatókat. Ugyanilyen lelkesedéssel vesz részt a rezidensek képzésében, a szakorvosok továbbképzésében. Nagy sikert arattak az országban a szakdolgozók körében, a vezetésével évente megrendezett szakdolgozói tudományos ülések is.

Azt már csak csodálni lehet, hogy mindezek mellett még a sportra is jutott ideje, szívesen teniszezik, de évek óta elnökként, sikeresen irányítja a Debreceni Egyetemi Atlétikai Clubot.

A 65 éves *Tóth Csaba professzor* életének csak egy-egy mozzanatát emeltük ki, de ezek is bizonyítják, hogy az egykori tanítómester útjára lépve, eredményekben, sikerekben igen gazdag életmű áll mögötte. Munkatársai ezért nemcsak tisztelik, hanem amit ennél fontosabbnak tart, szeretik is. Elérte azt, ami csak keveseknek adatik meg, munkásságával iskolát teremtett, kiváló szakembereket nevelt, az országos szakmai vezető testületekben meghatározó a véleménye.

Köszönet ezért a 65 éves *Tóth Csaba professornak*, akinek munkatársai, kollégái, barátai, tanítványai jó egészséget, hosszú, boldog éveket kívánnak.

Debrecen, 2005. szeptember 1.

Varga Attila dr.
egyetemi docens



...egyszerre
visszatér
a gondtalanság
öröme

MYCOSYST[®]
Gyno

Nőgyógyászati és urológiai
gombás fertőzések kezelésére.



RICHTER GEDEON RT.

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Nőgyógyászati Marketing Osztály: 432 4455 www.richter.hu

Mycosyst-Gyno kapszula **Alkalmazási előírás OGYI-engedélyszáma:** 8021/55/2003 **Minőségi és mennyiségi összetétel:** 150 mg fluconazolium kapszulánként. **Javallat:** akut vagy recidiváló vaginális candidosis kezelésére, valamint visszatérő vaginális candidosis kiújulásának megelőzésére, Candida balanitis kezelésére. **Ellenjavallat:** Fluconazol, vagy más azol származék iránti ismert túlérzékenység. Cisaprid együttdása fluconazol terápiában részesülő betegeknek ellenjavallt. **Legfontosabb mellékhatások:** hányinger, hányás, alhasi fájdalom, flatulencia és hasmenés, bőrkiütés. **1x 90%6SzJ V, 1x fogyasztói ár:** 2004 Ft, **Tb. Támogatás:** 956 Ft, **beteg fizet:** 1048 Ft, 90%-os támogatással: 397 Ft (6SzJ), **V, 2x fogyasztói ár:** 3874 Ft, **Tb. Támogatás:** 1905 Ft, **beteg fizet:** 1969 Ft, 90%-os támogatással: 676 Ft (6SzJ) Az új közlőny megjelenésével az árak változhatnak. **További részletes információt az alkalmazási előírat tartalmaz!**