

# GYAPOTBETAKARÍTÁS



## Levélperzelés.

A levélperzelés megkezdésének ideje augusztus vége, szeptember eleje. Ott kell végezni, ahol a kovadás kezdetén a gyapotrügy még növekedésben van, a levelek élénk zöldök és a gyapot virágzik. Befejtésének határideje szeptember 25. A perzelő anyag kipermetésére Fenomán Futura permetezőgépek a megfelelőek. A permetezést a termelést vállalkozó szakközegei irányítják.  
A levélpermetezés hatása az időjárástól függően 6-10 nap alatt mutatkozik meg abban, hogy a levelek 60-90 °C-ig fokozatosan lehull. Ezzel a gyapot beérését jelentősen meggyorsítjuk.

## Magvasgyapot betakarítása.

A gyapotrémálás során ez a legfontosabb felkészülést és a legtöbb munkaerőt igénylő feladat.

## Szárító.

A szárítás csak akkor lesz eredményes, ha a levegőcsere biztosítása érdekében a fal alól részén, valamint a mennyezetén szabályozható, szellőző nyílásokat készítenek.  
A télikor a magvasgyapotot 10-15 cm vastagban kell lerakni és közben gyakran forgatni.  
A levegő hőmérséklete 60-65 °C lehet, de vélemény szerint a legjobb a 50 °C-ot nem haladhatja túl.  
A megszártott magvasgyapotot a szállás előtt le kell hűteni. A gyapot akkor száradt ki és szállítható, ha a mag faggal elharapva ropog.  
A tapasztalatunk szerint egy 20 négyzetméter alapterületű szárító kapacitása naponta 10-15 q magvasgyapot.

## Kétkézes szedés.

A szedő 2 sor között halad és először az egyik sor belső oldaláról, majd utána a másiktól szedi a gyapotot, úgyhogy az egyik kezével megfogja az érett gyapot gerezdjét, egy mozdulattal kiemeli, a kiemelő mozdulattal egyidőben azonban már a másik kezével egy másik kikovadt tokhoz nyúl és a magvasgyapot hasonló módon kiemeli. Ezen részmozdulatokat folyamatosan végzi. Fontos, hogy amint a szedő a magvasgyapotot kiemelte, azt ne tegye minden esetben a kötényébe, hanem 4-5 tok tartalmát gyűjtse markába össze és azokat egyszerre tegye kötényébe, a megfelelő rekeszbe. A szedő mindig legalább 2 kötényt kössön maga elé. Az első kötényt - amint az megtelt - tegye le a földre, ahonnan azt az összehordó munkás a szájához viszi. A szedést pedig megszakítás nélkül a tartalék kötényébe folytathatja.



## Fagy előtti gyapot szedése.

A gyapot szedését akkor kezdjük meg, amint a többen az első tokok teljesen kikovadtak. A magvasgyapotot osztályozva kell szedni. Külön kell tartani az egyes gyapotrügyeket és teljesen el kell különíteni a beteg, valamint a szines gyapotot. Nem szabad a gyapotot szedni levelekkel, porral és földdel beszenyezni. A szedést az évtől függően 3-4 naponként meg kell ismételni. Maradni kell a vesztegek ellen, meg kell akadályozni, hogy a magvasgyapotot éretlenül szedjék, vagy, hogy a hártszalok között a gyapot egyrésze visszamaradjon. A földre lehullt gyapotot is fel kell szedni.

## Fagy utáni gyapot szedése.

Az első erősebb fagy (-3, -4 °C) esetén a gyapot betakarítását a legkorábbi idő alatt be kell fejezni. Először le kell szedni minden magvasgyapotot, amely még a fagy előtt beért. Utána le kell szedni a fagy hatására egészen vagy félig felnyit tokokból származó termést. Végül pedig legalább a fagyot követő 15-20 napon belül be kell takarítani az összes fel nem nyit, vagy alig felnyit tokokat.

## Kurákszedő fésű.

Az alig vagy egyáltalán fel nem nyit tokok, burtok lezsedésére alkalmas a kurákszedő fésű. Teljesítménye látványosan napi 4-6 tk. A kurákat szedni, szellő, fedett helyen kell tartani és állandó forgatással a bemelegedéstől meg kell óvni.