

Hiszteroszkópia során végzett cervix dilatáció hatása az azt követő terhességekre

Molnár Szabolcs^{1,3}, Farkas Eszter², Lampé Rudolf¹, Török Péter¹

¹Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

²Kenézy Gyula Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Debrecen

³Jósa András Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Nyíregyháza

Tárgy: Napjainkban a diagnosztikus és operatív hiszteroszkópia szerves részét képezi a meddőség kivizsgálásának. Az operatív beavatkozások során a méhszáj tágítására van szükség. A tanulmány célja az volt, hogy megvizsgáljuk a méhszáj tágítás hatását a későbbi terhesség kimenetelére.

Anyagok és módszerek: 1975 operatív hiszteroszkópos beavatkozást vizsgáltunk két intézményben 10 éves periódus során. 66 beteget vontunk be a tanulmányba, akiknek bármely fajta szülészeti eseményük volt a beavatkozást követően. A csoportokat a szülészeti anamnézis és a műtét típusa alapján képeztük. Az operatív beavatkozás típusa alapján a következő csoportokba soroltuk a betegeket: transzcervikális myoma rezekción, polyp rezekción, septum rezekción és adhesiolízisen átesettek. A kiviselt

terhességi heteket elemeztük minden csoportban és ezeket összehasonlítottuk a kontroll csoportban kapott eredményekkel. A kontroll csoportot ugyanazokban az intézményekben lezajlott 1000 egymást követő szülés alkotta.

Eredmények: Nem találtunk szignifikáns különbséget a kiviselt terhességi hetek tekintetében az operatív hiszteroszkópián átesettek és a kontroll csoport között. Ezen kívül nem találtunk statisztikai különbséget sem a szülészeti előzmények alapján, sem a beavatkozás típusok alapján létrehozott csoportok között.

Következtetés: Az operatív hiszteroszkópia során alkalmazott cervix dilatáció, függetlenül a betegek szülészeti anamnézisétől és a beavatkozás típusától nem növelte a koraszülés kockázatát.