

DIFTÉRIA

Lázzal, torokfájással, esetleg rekedtséggel kezdődő betegség. A beteg torkában gyorsan terjedő, penészhez hasonló sárgás vagy szürkésfehér lepedék támad. Sürgősen hívjunk orvost, mert korai kezeléssel biztosabb a gyógyulás! A diftériát főleg azok kapják meg, akik nem részesültek megelőző oltásban. Ne engedjük, hogy gyermekeink elmaradjanak a diftéria-elleni védőoltásokról!

VÖRHENY (SKARLÁT)

Hirtelen magas lázzal, hányással, torokfájással kezdődik. Rövidesen apró pontszerű, majd részben összefolyó, élénk vörös kiütés jelenik meg és az arcon, nyakon kezdődve végigterjed az egész testen. A betegség lezajlása után a bőr lehámlik. A vörheny komoly szövődményekkel járhat. Orvosi kezelés feltétlenül szükséges!

KANYARÓ

Lázzal, köhögéssel, náthával, könnyezéssel kezdődik, majd néhány nap múlva lencsenagyságú vörös kiütések lepik el a testet. A kanyaró erősen ragályos, a beteg elkülönítése szükséges. Tüdőgyulladás és más szövődmények is társulhatnak hozzá. A beteghez hívjunk orvost és pontosan kövessük utasításait!

SZAMÁRKÖHÖGÉS

Egyszerű köhögéssel kezdődik, majd fokozatosan mind hevesebb, kínzó köhögési rohamokkal járó hosszantartó betegséggé fejlődik ki. A betegség tetőfokán a köhögés ugatásszerű, hangos sípoló belégzéssel. Erősen fertőz, különösen csecsemőkre igen veszélyes lehet. Mivel kezdetben nehezen felismerhető, gyermekeinket tartassuk távol minden köhögős embertől és a betegségnak még gyanúja esetén is vegyünk igénybe orvosi segítséget!

TUBERKULÓZIS

Hosszú lefolyású, gyermekkorban igen veszélyes betegség. Ha a beteg kedvetlen, étvágytalan, fogy, köhécse, esténként lázas, vigyük orvosi vizsgálatra. A tuberkulózis elkerülése céljából ne hagyjuk gyermekeinket tüdőbetegek, vagy köhögő, köpködő emberek közelében! Gyermekeink ne játszanak porban, piszokban, ne igyanak más poharából, ne fogyasszanak forralatlan tejet! Jó védelmet nyújt tuberkulózis ellen az újszülöttkorban elvégzett BCG-oltás. Ne mulasszuk el!

INFLUENZA

Hirtelen kezdődik magas lázzal, erős fájással, amihez később sokszor köhögés, nátha is járulhat. A betegség kórokozói köhögés, füsszentés, beszéd közben a levegőbe került apró nyálkacseppek viszik át a betegről az egészséges gyermekekre. Óvjuk gyermekeinket a lázas, náthás, köhögős emberektől! Influenzában megbetegedett gyermekeinket azonnal fektessük ágyba és sürgősen hívjunk orvost!

DIZENTÉRIA

Heves hasmenéssel, híg, nyálkás, néha véres széklettel és lázzal járó fertőző bélbetegség, mely különösen csecsemőknél és kisgyermeknél veszélyes. Kórokozói a beteg ember székletéből jutnak a külvilágba és legyek közvetítésével, vagy más módon fertőzhetik élelmiszereinket és betegítik meg a fertőzött ételt, vagy italt fogyasztó embert. Védjük gyermekeinket a dizentériától! Csak tisztán kezelt ételt, gondosan mosott gyümölcsöt, forralt tejet adjunk nekik! Irtsuk a legyeket! Dizentéria gyanúja esetén azonnal hívjunk orvost!

JÁRVÁNYOS GYERMEKBÉNULÁS

Heine-Medin kórnak is nevezik. Súlyos fertőző betegség. Láz, fájás, végtagfájdalmak, torokfájás, emésztési zavarok után pár nap múlva bénulás lép fel főleg a lábszáron, néha az alkaron. A gyermek nem tud lábraállni, lábát vagy kezét nem emeli. A bénulások gyógyítása hosszadalmas és annál eredményesebb, minél korábban kezdődik az orvosi kezelés. Azonnal hívjunk orvost, ha lázas betegség mellett a gyermek lépni nem tud, járása bizonytalan!



FERTŐZŐ GYERMEKBETEGSÉGEK

