

Hyperstimulatio korszerű kezelése

Fekete István

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

Hazánk gyermektelen házaspárjainak nem kis száma kényszerül asszisztált reprodukciós eljárás igénybevételére. Az IVF beavatkozások egyik legfenyegetőbb szövődménye a hyperstimulatio syndroma kialakulása. A tünetegyüttes kialakulásában alapvető a tüszőrepesztéshez használt HCG beadása, melynek hatására a szervezet só és vízhiánytartásában igen rapid, nehezen befolyásolható átrendeződés alakul ki. Bár a vélemények egybehangzóak arra vonatkozóan, hogy a kórkép korai esetei jól felismerhetők és megelőzése a stimulatio során könnyebb, mint a kialakult tünetegyüttes és komplex anyagcserezavar kezelése, mégis időről időre előfordulnak ilyen páciensek az egyes osztályokon. Súlyos esetben a probléma túlmutat

a nőgyógyászati diszciplínán, eredményes kezelése komplex belgyógyászati- nőgyógyászati – aneszteziológia ismereteket igényel. A már kialakult hyperstimulatio szindróma kezelése a magyarországi intézményekben nem azonos kezelési elvekkel valósul meg, számos esetben kevésbé súlyos esetek túlkezelésével szembesülünk és ugyan ilyen gyakorisággal lehetünk tanúi a tünetek nem megfelelő értékeléssel kialakuló súlyos anyagcsere folyamatoknak. A szerző a legfrissebb közlemények adatait felhasználva próbál mindenki számára egységesen alkalmazható kezelési protokollt készíteni, a Debreceni Egyetem Női Klinikájának 10 éves anyagában előforduló konkrét esetek bemutatásával.