

Változások a nőgyógyászati daganatok diagnosztikájában és terápiájában

Póka Róbert

Debreceni Egyetem KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

A nőgyógyászati daganatok műtéti gyógyításában egyre fontosabb szerepet játszik a differenciált műtéti kezelés. A demográfiai változások egyre gyakrabban teszik szükségessé a morbiditást csökkentő fertilitás megőrzés és kevésbé invazív módszerek alkalmazása (trachelectomia és endoszkópos műtétek). Inoperabilis daganatok egyre nagyobb hányadában nyílik lehetőség kuratív műtéti kezelésre neoadjuváns kemoterápia alkalmazását követően és előrehaladott daganatokban is egyre gyakrabban érünk el olyan mértékű remissziót, ami lehetővé teszi a PET-CT

vezérelt teljes tumorredukciót kiújult petefészekrákban is. Az újonnan felismert kedvezőtlen prognosztikai jegyekkel terhelt daganat típusokban egyre jobban érvényesül a szokványos kiterjesztést meghaladó műtéti stratégia alkalmazása (II-es típusú endometriumcarcinoma, kiújult petefészekrák). A daganat biológiai viselkedésének és az alkalmazott gyógyszerekkel szembeni érzékenységének előrejelzésében a standard prognosztikai tényezők mellett klinikumban is alkalmazható molekuláris markerek és in vitro érzékenységi tesztek kidolgozására van szükség.